

| | | |
|--|--|---|
|  <p>ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG</p> | SYNTHESE MESURES ADDITIONNELLES AEROSOL | Code : REF-163 Fichier : F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI Version : 1 |
|--|--|---|


Mode de transmission :

- Par contact direct = par projection de particules plus petites que les gouttelettes générées par la toux, la conversation. Ces particules restent en suspension dans l'air quelques heures et peuvent donc être transportées à distance pour infecter d'autres personnes sans aucun contact direct avec la personne infectée.
Ces situations se limitent à un nombre restreint de maladies ; tels que la tuberculose, la varicelle, la rougeole et quelques maladies rares.

| MESURES COMPLEMENTAIRES AUX PRECAUTIONS STANDARD | |
|---|--|
| Information au resident-e | <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place mesures additionnelles aérosol sur prescription médicale - Expliquer les motifs des mesures instaurées - Enseigner les indications et la technique du port du masque - Mettre à disposition des masques |
| Placement du resident-e | <ul style="list-style-type: none"> - Placement en chambre individuelle avec WC ou chaise percée - Aérer la chambre par l'ouverture de la fenêtre toutes les 4 heures avec porte fermée |
| Déplacement/transfert du resident-e | <ul style="list-style-type: none"> - Informer le service destinataire avant le transport du résident-e - Programmer si possible le rendez-vous en fin de consultation - Sortie de chambre, limiter aux besoins vitaux - Si sortie du résident-e de la chambre avec des habits, protection et literie propre - Pour le transport, pas de surblouse, pas de gants mais port du masque de type II ou IIR pour la-le résident-e - Pour le transport, pas de surblouse, pas de gants mais port du masque FFP2 pour l'accompagnant |
| Masque/Lunettes  |  <ul style="list-style-type: none"> - Avant d'entrer en chambre, port du masque FFP 2 et à retirer après être sortie de la chambre et avoir fermé la porte |
| Informations aux visites | Informé de la mesure d'isolement et sur les mesures à prendre : <ul style="list-style-type: none"> - Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre. - Port du masque FFP 2 avant d'entrer en chambre et retrait seulement après être sortie de la chambre et avoir fermé la porte - Ne pas s'asseoir sur le lit |

Mode d'utilisation - masque de protection faciale

1



Ouvrir le masque.

2



L'adapter sur le visage, bien l'ajuster sous le menton.

3



Passer l'élastique supérieur au-dessus des oreilles, l'élastique inférieur au-dessous des oreilles.

4



Appliquer la barrette de fixation nasale, lui faire épouser les contours du nez et des pommettes.

5



Test Fit check

Obturer la surface filtrante avec les mains.

Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à se plaquer sur le visage.

S'il est possible d'inhaler facilement, le masque fuit ou n'est pas adapté.

6



Se désinfecter les mains après avoir mis le masque.