

 <p>ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG</p>	<b>DOCUMENT DE REFERENCE</b> <b>Infection staphylocoques dorés</b> <b>résistants à la méticilline ou MRSA – EMS</b> <b>et en institutions spécialisées pour</b> <b>adultes</b>	Code : REF-170_F Fichier : F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI Version : 2 du 2.4.2024
--	--	---

Informations générales	
Informations générales sur l'agent infectieux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MRSA = staphylocoques dorés résistants à la méticilline</li> <li>• Survit plusieurs jours dans l'environnement</li> <li>• Bactérie résistante aux antibiotiques de la classe des pénicillines</li> <li>• Lors d'une infection au MRSA et non un portage, les bactéries sont présentes en plus grands nombres, d'où l'instauration de Mesures Additionnelles</li> </ul>
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Par contact direct, exemple : de personne à personnes, via les mains</li> <li>• Par contact indirect lorsque l'on touche l'environnement ou le matériel contaminé</li> </ul>
Période d'incubation	Variable
Période de contagiosité	Aussi longtemps que la-le résident-e est infecté-e
Mesures Additionnelles (MA) à mettre en place sur avis médical	<p><b>CONTACT ou GOUTTELETTE</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>Si pneumonie à MRSA</b></p> <p style="text-align: center;">(= infection des voies respiratoires inférieures)</p>
Durée MA	Durant la durée de l'infection au MRSA

Prise en charge du résident-e	
Mesures spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décolonisation <a href="https://www.fr.ch/document/493016">https://www.fr.ch/document/493016</a></li> <li>• En cas de transfert, indiquer sur le dossier si la-le résident-e est infecté-e au MRSA</li> </ul>
Chambre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résident-e infecté-e à l'admission en EMS ou en institution spécialisée pour adultes : chambre individuelle</li> <li>• Résident-e infecté-e en cours de séjours à l'EMS ou en institution spécialisée pour adultes en chambre double : en l'absence de facteurs de risque du voisin-e de chambre, ne pas déplacer la-le résident-e de chambre</li> </ul>
Sanitaire	En l'absence de WC dans la chambre individuelle ou si chambre à plusieurs lits, mettre à disposition de la-le résident-e infecté-e un WC ou chaise percée dédiée

Nom et emplacement du fichier	Page
Document de référence Infection staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA/site internet HPCI Fribourg	

Circulation	<p>Si pneumonie à MRSA et/ou incapacité à maintenir le site infecté hermétiquement fermé (exemple par un pansement étanche ou une protection urinaire étanche ou une sonde vésicale sans fuite) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La-le résident-e reste en chambre jusqu'à la fin de son isolement</li> <li>• Ne participe pas aux animations et au repas en salle à manger</li> <li>• Limiter les déplacements aux besoins vitaux</li> </ul> <p>Si site infecté hermétiquement fermé (exemple par un pansement étanche ou une protection étanche ou une sonde vésicale sans fuite) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La-le résident-e infecté-e circule librement, participe aux animations en collectivité et au repas en salle à manger</li> </ul>
<p>Equipement de Protection Individuel (EPI) pour le personnel</p>	<p><u>En cas d'infection à MRSA :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Avant d'entrer en chambre, port de la surblouse</b> : si contact direct avec la-le résident-e ou son environnement immédiat. Pas nécessaire si simple passage en chambre. Eliminer la surblouse en chambre, après 24 heures d'utilisation maximum.</li> </ul> <p><u>En cas d'infection pulmonaire à MRSA :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Avant d'entrer en chambre, port de la surblouse et du masque de soin</b> : si contact à moins de 2 mètres avec la-le résident-s. Pas nécessaire si simple passage en chambre. Eliminer la surblouse, après 24 heures d'utilisation maximum et le masque de soin en chambre.</li> </ul>
Affiches signalétiques	<p>Sur la porte de la chambre</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A l'extérieur</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>A l'intérieur</p>  </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">OU</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A l'extérieur</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>A l'intérieur</p>  </div> </div>

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Document de référence Infection staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA/site internet HPCI Fribourg	2 / 6	4/23/2024

Matériel de soins	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réserver au résident-e pendant la durée des Mesures Additionnelles. Si pas possible, désinfecter entre chaque résident-e</li> <li>• Privilégier le matériel à usage unique</li> </ul>
Evacuation du linge et vêtements	<p><u>Si Mesures Additionnelles de Contact :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placer un sac à linge en chambre</li> <li>• Pour évacuer le sac à linge, le fermer, le doubler et le déposer dans le vidoir avec les autres sacs à linge durant la durée des mesures additionnelles</li> </ul> <p><u>Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :</u> Filière habituelle, selon les Précautions Standard, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sacs à linge usuels dans le vidoir, double emballage si souillé avec des liquides biologiques</li> <li>• Ne pas rincer le linge et/ou habit souillé à cause des risques de projection</li> </ul>
Evacuation de la vaisselle	Aucune procédure particulière, suivre la filière habituelle (pas de vaisselle jetable)
Elimination des déchets	Filière habituelle, selon les Précautions Standard
Voisin-e de chambre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir un isolement géographique de 2 mètres au moins, par un marquage au sol</li> <li>• La-le voisin-e de chambre peut circuler librement</li> <li>• Selon avis médical et si facteur de risque, dépistage par frottis du nez, gorge, aisselles et plis inguinaux</li> </ul>
Visites	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorisée</li> <li>• Ne pas s'asseoir sur le lit</li> <li>• Désinfection des mains avant d'entrer en chambre et en sortant de la chambre</li> </ul>

### Nettoyage/Désinfection

Matériel de soins	Nettoyage/Désinfection du matériel de soins entre chaque résident-e avec le détergent-désinfectant habituel
Linge et vêtements	<p>Selon les Précautions Standard :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C</li> <li>• Nettoyage des vêtements du résident-e à minimum 40°C</li> <li>• Changer le linge de lit et le linge de bain dès souillures et selon les règles institutionnelles</li> </ul>
Environnement	<p>Planification du nettoyage de la chambre en dernier.</p> <p>Pendant la durée des Mesures Additionnelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage/Désinfection de l'environnement direct du résident-e (table de nuit, moyens auxiliaires, téléphone, sonnette, accoudoirs, télécommande ...), des sanitaires et du sol avec le détergent-désinfectant habituel</li> </ul> <p>A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du résident-e :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changement du rideau de séparation même si la-le résident-e reste dans la même chambre</li> <li>• Changement des linges de lit et des linges de bain à la levée de l'isolement</li> <li>• Nettoyage/Désinfection de l'environnement direct du résident-e, des sanitaires et du sol avec le détergent-désinfectant habituel</li> </ul>

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Document de référence Infection staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA/site internet HPCI Fribourg	3 / 6	4/23/2024


<b>Déclaration obligatoire</b>	
Médecin cantonal	Non, sauf si flambée (≥2 situations), les cas doivent être déclarés dans un délai de 24 heures via le formulaire de <a href="#">l'OFSP</a> A l'adresse e-mail : <a href="mailto:maltrans@secu.fr.ch">maltrans@secu.fr.ch</a>

<b>Références</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Document adapté selon les recommandations nationales de Swissnoso "Prevention and control of MDRO in the non-outbreak setting" (<a href="#">Version 1.0, octobre 2021, 1MB</a> )</li> <li>- Selon Guide pratique 2018 de prévention et de traitement des infections en établissement médico-social</li> </ul>
-------------------	--

<b>Nom et emplacement du fichier</b>	<b>Page</b>	<b>Date</b>
<i>Document de référence Infection staphylocoques dorés résistants à la métililine ou MRSA/site internet HPCI Fribourg</i>	4 / 6	4/23/2024

**A plastifier et à coller sur la porte d'entrée de la chambre**

<b>Nom et emplacement du fichier</b>	<b>Page</b>	<b>Date</b>
<i>Document de référence Infection staphylocoques dorés résistants à la métililine ou MRSA/site internet HPCI Fribourg</i>	5 / 6	4/23/2024

RESUME DES		MESURES SPECIFIQUES
Mesures Additionnelles (MA)	<b>CONTACT</b>  Durant la durée de l'infection	<b>GOUTELLETES, si pneumonie à MRSA</b> (= infection des voies respiratoires inférieures)  Durant la durée de l'infection
Hygiène des mains	Désinfection des mains à la solution hydroalcoolique avant d'entrer en chambre et en sortant de la chambre et selon les 5 indications de l'OMS  <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>5 INDICATIONS DE BASE À RESPECTER</b>            Un geste d'hygiène des mains doit être pratiqué:            avant contact patient;            après contact patient;            avant acte aseptique (propre);            après liquides biologiques/gants;            après contact avec objet/environnement.         </div>	
Equipement de Protection Individuel (EPI) pour le personnel	<b>Avant d'entrer en chambre :</b>  <b>Surblouse pour tout contact direct</b> avec la-le résident-e ou son environnement immédiat	<b>Avant d'entrer en chambre :</b>  <b>Masque et surblouse pour tout contact de ≤ 2m</b>
	La surblouse peut être utilisée 24 heures (maximum 2 surblouses sur un statif en chambre)	
Dispositifs médicaux	Privilégier matériel à usage unique Limiter au maximum le stockage de matériel en chambre Désinfecter le matériel avec le détergent/désinfectant habituel après usage	
Linge	Sac à linge dans la chambre. Pour évacuer le sac à linge sale, le fermer, <b>le doubler</b> et le déposer dans le vidoir avec les autres sacs à linge	Evacuer le linge sale dans les sacs à linge au vidoir
Déchets	Evacuer les déchets dans le sac poubelle au vidoir Eliminer les piquants/tranchants dans les safe box	
Environnement	Nettoyage/Désinfection avec le détergent/désinfectant habituel, en respectant le principe du plus propre au plus sale	

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Document de référence Infection staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA/site internet HPCI Fribourg	6 / 6	4/23/2024